数学 解答一覧と配点

大問	小問	配点	解答例																					
1	問 1	5	$\frac{1}{x} = \frac{2}{3-\sqrt{5}} = \frac{2(3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})} = \frac{2(3+\sqrt{5})}{9-5} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ $x + \frac{1}{x} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} + \frac{3+\sqrt{5}}{2} = 3 \quad \text{J 2 点}$ $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 3^2 - 2 = 7 \quad \text{J 3 点}$																					
	問 2	5	$\begin{cases} 2x-1 < 7 & \dots\dots ① \\ x(x+1) < 12 & \dots\dots ② \end{cases}$ <p>①より, $-7 < 2x-1 < 7 \quad -6 < 2x < 8 \quad -3 < x < 4 \quad \dots\dots ①'$ J 2 点 ②より, $x^2+x-12 < 0 \quad (x+4)(x-3) < 0 \quad -4 < x < 3 \quad \dots\dots ②'$ J 2 点 ①', ②'の共通範囲を求めると, $-3 < x < 3$ J 1 点</p>																					
	問 3	5	$\bar{p} : ab$ は 4 の倍数である $\bar{q} : a, b$ はともに偶数である a, b がともに偶数のとき, $a=2m, b=2n$ (m, n は整数)と表される。このとき, $ab=2m \cdot 2n=4mn$ となるから, ab は 4 の倍数である。 よって, $\bar{q} \implies \bar{p}$ は真であるから, その対偶である $p \implies q$ も真である。 J 5 点																					
	問 4	5	余弦定理により, $\cos B = \frac{3^2 + 5^2 - (\sqrt{10})^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$ $\sin B > 0$ であるから, $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$ J 2 点 $\triangle ABC$ の外接円の半径を R とすると, 正弦定理により, $2R = \frac{CA}{\sin B} \quad R = \frac{\sqrt{10}}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5\sqrt{10}}{6}$ J 3 点																					
	問 5	5	得点から平均値を引いた値 (偏差) は次のようになる。 ただし, $x-7=a, y-7=b$ とする。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>生徒</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>偏差</td> <td>-3</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>-2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>a</td> <td>b</td> </tr> </table> 偏差の和が 0 であるから, $1+a+b=0 \quad b=-a-1 \quad \dots\dots ①$ (偏差) ² の平均値が 3.2 であるから, $(-3)^2 + 2^2 + 1^2 + (-2)^2 + 3^2 + a^2 + b^2 = 3.2 \times 10$ $a^2 + b^2 = 5 \quad \dots\dots ②$ J 2 点 ①を②に代入して, $a^2 + (a+1)^2 = 5 \quad a^2 + a - 2 = 0 \quad (a+2)(a-1) = 0 \quad a = -2, 1$	生徒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	偏差	-3	0	2	0	1	-2	3	0	a
生徒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
偏差	-3	0	2	0	1	-2	3	0	a	b														

		<p>①より, $a=-2$ のとき, $b=1$ $a=1$ のとき, $b=-2$ $x < y$ より $a < b$ であるから, $(a, b) = (-2, 1)$ よって, $(x, y) = (5, 8)$ 』 3 点</p>
25 点	問 1	<p>8</p> <p>(1) $f(1) = 1 - a + 2(a + 1) = 7$ より, $3 + a = 7$ $a = 4$ 』 3 点 このとき $f(x) = x^2 - 4x + 10$ $= (x - 2)^2 + 6$ よって, $y = f(x)$ のグラフは右のよう なる。</p> <p style="text-align: right;">』 5 点</p>
		<p>6</p> <p>(2) $y = f(x)$ のグラフの頂点(2, 6)を x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ移動すると, 点(4, 3)に移る。 また, x 軸に関する対称移動によって点(4, 3)は点(4, -3)に移り, x^2 の符号は反対になるから, 求めるグラフは x^2 の係数が -1, 頂点が(4, -3)の放物線である。その式は, $y = -(x - 4)^2 - 3$ 』 6 点 すなわち, $y = -x^2 + 8x - 19$ (この形でも可)</p>
	問 2	<p>6</p> $f(x) = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + 2a + 2$ <p>(i) $\frac{a}{2} < 1$, すなわち, $a < 2$ のとき $x \geq 1$ において, $f(x)$ は $x = 1$ で最小となるから, $m = f(1) = a + 3$ 』 3 点</p> <p>(ii) $1 \leq \frac{a}{2}$, すなわち, $2 \leq a$ のとき $x \geq 1$ において, $f(x)$ は $x = \frac{a}{2}$ で最小となるから, $m = f\left(\frac{a}{2}\right) = -\frac{a^2}{4} + 2a + 2$ 』 3 点</p> <p>(i), (ii)より, $a < 2$ のとき, $m = a + 3$ $2 \leq a$ のとき, $m = -\frac{a^2}{4} + 2a + 2$</p>
問 3	<p>5</p> <p>$x \geq 1$ におけるすべての実数 x について $f(x) > 0$ となるための条件は, 問 2 で用いた m において, $m > 0$ となることである。 $\cdot a < 2$ のとき, $a + 3 > 0$ より, $a > -3$ 』 2 点</p>	

		$\cdot 2 \leq a$ のとき, $-\frac{a^2}{4} + 2a + 2 > 0 \quad a^2 - 8a - 8 < 0$ これを解いて, $4 - 2\sqrt{6} < a < 4 + 2\sqrt{6}$ よって, $2 \leq a < 4 + 2\sqrt{6}$ 』 2 点 以上により, 求める a の値の範囲は, $-3 < a < 4 + 2\sqrt{6}$ 』 1 点
3	問 1	6 <p>(1) T の百の位の数 a, 十の位の数 b, 一の位の数 c とすると, $T = 100a + 10b + c$ T の各位の数の和が 3 の倍数のとき, $a + b + c = 3n$ (n は自然数) とおける。 $c = 3n - a - b$ であるから, $T = 100a + 10b + (3n - a - b)$ 』 1 点 $= 99a + 9b + 3n$ $= 3(33a + 3b + n)$ $33a + 3b + n$ は整数であるから, T は 3 の倍数である。 』 2 点 また, T が 3 の倍数のとき, $T = 3m$ (m は自然数) とおける。このとき $a + b + c = T - 99a - 9b$ 』 1 点 $= 3(m - 33a - 3b)$ $m - 33a - 3b$ は整数であるから, $a + b + c$ は 3 の倍数である。 』 2 点</p>
		6 <p>(2) 各位の数の和が 3 の倍数になるのは, 選んだ 3 枚の数が次の場合である。 (1, 2, 3), (1, 2, 6), (1, 3, 5), (1, 5, 6), (2, 3, 4), (2, 4, 6), (3, 4, 5), (4, 5, 6) 』 2 点 よって, 3 の倍数の個数は, $3! \times 8 = 48$(通り) 』 4 点</p>
	25 点	6 <p>(1) 起こり得るすべての場合の数は, ${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$(通り) A の得点が 4 点のとき, 5, 6 のカードは B が持っている。残りの 1, 2, 3 のカードを A に 2 枚, B に 1 枚分ける方法は, ${}_3C_2 = 3$(通り) 』 3 点 よって, 求める確率は, $\frac{3}{20}$ 』 3 点</p>
	問 2	7 <p>(2) X: A の得点の方が B の得点より高い Y: B が持つカードの中に 1 のカードがある とすると, 求める確率は $P_X(Y)$ である。 A の得点の方が B の得点よりも高いとき, A は 6 のカードを持っている。 残りの 5 枚を A に 2 枚, B に 3 枚分けるから, $n(X) = {}_5C_2 = 10$ 』 2 点 $X \cap Y$ は, A が 6 のカードを持ち, B が 1 のカードを持つ場合である。 $n(X \cap Y) = {}_4C_2 = 6$ 』 2 点 求める確率は, $P_X(Y) = \frac{n(X \cap Y)}{n(X)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 』 3 点</p>

4	問 1	5	$f'(x) = -2x^2 + 8$ $= -2(x+2)(x-2)$ <p>増減表は右のようになる。』 3 点</p> <p>よって、$f(x)$は$x=-2$のとき、 極小値$-\frac{32}{3}$をとる。』 2 点</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>...</td> <td>-2</td> <td>...</td> <td>2</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>↘</td> <td>$-\frac{32}{3}$</td> <td>↗</td> <td>$\frac{32}{3}$</td> <td>↘</td> </tr> </table>	x	...	-2	...	2	...	$f'(x)$	-	0	+	0	-	$f(x)$	↘	$-\frac{32}{3}$	↗	$\frac{32}{3}$	↘
	x	...	-2	...	2	...															
	$f'(x)$	-	0	+	0	-															
$f(x)$	↘	$-\frac{32}{3}$	↗	$\frac{32}{3}$	↘																
問 2	5	<p>$f(x)=10$の実数解は、曲線 C と直線 $y=10$ の 共有点の x 座標に等しい。</p> <p>右の図のように、共有点は 3 個ある。</p> <p>』 グラフをかいて (または 3 つの解を求めて) 2 点 よって、$f(x)=10$ の異なる実数解について、 正の解は 2 個、負の解は 1 個である。』 3 点</p>
25 点	問 3	4	<p>(1) $f(3) = -18 + 24 = 6$ であるから、点 A の座標は、(3, 6)</p> <p>直線 OA の方程式は、$y=2x$</p> <p>$f'(t) = 2$ となる $t (> 0)$ の値は、 $-2t^2 + 8 = 2$ 』 2 点 $t^2 = 3$ $t > 0$ より、$t = \sqrt{3}$</p> <p>$f(\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}$ であるから、点 $(\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$ は第 1 象限にある。</p> <p>よって、点 B の x 座標は、$\sqrt{3}$ 』 2 点</p>																		
		4	<p>(2) 直線 l の方程式は、$y - 6\sqrt{3} = 2(x - \sqrt{3})$ 』 4 点</p> <p>すなわち、$y = 2x + 4\sqrt{3}$ (この形でも可)</p>																		
	問 3	7	<p>(3) 直線 l と y 軸との交点を D とすると、点 D の 座標は $(0, 4\sqrt{3})$ で、右図が得られる。』 2 点</p> <p>$S_1 = \triangle OAB = \triangle OAD$</p> <p>$= \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 3 = 6\sqrt{3}$ 』 2 点</p> <p>$S_2 = \int_0^3 \left\{ \left(-\frac{2}{3}x^3 + 8x \right) - 2x \right\} dx$</p> <p>$= \int_0^3 \left(-\frac{2}{3}x^3 + 6x \right) dx$</p> <p>$= \left[-\frac{1}{6}x^4 + 3x^2 \right]_0^3 = -\frac{81}{6} + 27 = \frac{27}{2}$ 』 2 点</p> <p>よって、$\frac{S_1}{S_2} = 6\sqrt{3} \cdot \frac{2}{27} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$ 』 1 点</p>